



Knowledge grows

YaraVita™ MOLYTRAC 250

Течен листен тор с максималното възможно съдържание на Молибден

Съдържание на YaraVita™ MOLYTRAC 250:

Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л
Съдържа намокрители и прилепители.

Какво е YaraVita™ MOLYTRAC 250?

- **YaraVita™ MOLYTRAC** е високо концентриран разтвор. Съдържанието на молибден в **YaraVita MOLYTRAC 250** е до 4 пъти по-високо от това на другите торове.
- **YaraVita™ MOLYTRAC 250** е лесен за употреба, удобен за транспорт и съхранение.
- **YaraVita™ MOLYTRAC 250** е течна формулация, лесна за измерване, сипване и смесване в резервоара на пръскачката.
- **YaraVita™ MOLYTRAC 250** се усвоява бързо от растенията, има и продължително действие, което прави възможно намаляване на броя на пръсканията.

Предимства на листния тор YaraVita™ MOLYTRAC 250:

Молибденът е важен и незаменим хранителен елемент, макар и необходим на културите в много ниски дози.

Чистотата на суровините използвани за производството на **YaraVita™ MOLYTRAC 250** го прави безопасен за употреба при земеделските култури. Употребата му гарантира, че готовата земеделска продукция ще отговаря на световните стандарти за чистота и безопасност на здравето на хората и животните.

Продуктът е смесим с повечето препарати за растителна защита, което спестява време и пари.

Посетете : tankmix.com за повече информация.





Knowledge grows

ПРЕПОРЪКИ ПО КУЛТУРИ:



Рапица

При еднократно приложение във фаза начало на формиране на стъблото – 0.025 л/дка.
При среден до силен недостиг на молибден пръскане във фаза 4-6 лист – 0.025 л/дка и второ пръскане във фаза удължаване на стъблото на рапицата – 0.025 л/дка. Допълнително пръскане може да бъде направено 10-14 дена по-късно. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.



Пшеница

От фаза 2- ри лист до края на братене комбинацията от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра Вита Бортрак – 100 мл/дка. (Zadok G.S. 12 до 25). Същото пръскане във фаза флагов лист (Zadok G.S. 39) - 20 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.



Царевица

От фаза 4- 5 лист - комбинация от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра Вита Бортрак – 100 мл/дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза начало на изметляване.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.



Слънчоглед

Фаза 4-6 листа комбинация от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра Вита Бортрак – 100 мл/дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза бутонизация.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.



Фасул, грах и соя

Във фаза височина на растенията 5-15 см – 0.025 л/дка. При среден до сериозен недостиг на молибден трябва да повторим пръскането след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.



Оранжерийни култури

Максимална концентрация - 0.025 л/100 л вода.
Времето на приложение в зависимост от особеностите на културата.

Максимално количество вода за пръскане 100 л/дка.

Офиси:

София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03;
факс: 02/ 954 60 04
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
Варна /с.Тополи/ - тел: 05119/ 22 80; 21 40
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0817/ 72 293
Монтана - 0882 898 007

Дистрибутор за:

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;
0888 307 293; 0889 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
www.kvsagro.com